



مستشفى جامعة الملك عبد العزيز

العناية بالجروح بعد العملية الجراحية



إعداد الأستاذة: أروى الغامدي

منسقة جراحة قلب الأطفال

ود. عثمان الراضي

استشاري جراحة قلب الأطفال



الشق الرئيسي من  
جراحة القلب  
المفتوح، ملتئم  
بشكل جيد

الندوب  
الصغيرة حيث  
موقع أنابيب  
تصريف  
الصدر

عدوى:

إذا رأيت أيًا من هذه العلامات على طفلك في أحد مواقع الجرح أو موقع أنابيب تصريف الصدر ، اتصل بطبيبك مباشرة أو أحضر طفلك إلى قسم الطوارئ :

١- درجة حرارته عالية.

٢- أصبح موقع الجرح أكثر احمرارا من قبل أو الاحمرار أنتشر.

٣ - أصبح موقع الجرح أكثر سخونة من باقي الجلد المحيط.

٤- أصبح موقع الجرح يخرج أي سوائل.

٥- أصبح موقع الجرح منتفخًا.

٦- إذا خرج من موقع الجرح رائحة.

٧- إذا شكى طفلك من الألم الشديد في موقع الجرح.

## رعاية الجرح (قطع جراحي):

تلتئم مواقع الجروح في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد الجراحة.

ستدوب الغرز في الجرح الرئيسي تحت الجلد ولا تحتاج إلى إزالتها.

يجب إزالة غرز أنابيب الصدر بعد خمسة أيام من خروج الأنابيب.

## الاستحمام:

- من المهم الحفاظ على الجرح والجلد المحيط نظيفاً.

- بمجرد إزالة جميع الغرز وجميع الضمادات ، يمكن لطفلك الاستحمام.

- يجب غسل الجرح برفق بالماء الدافئ والصابون المعتدل غير المعطر او صابون الاطفال باستخدام أسفنجه نظيفة ناعمة أو قطعة قماش.

-لا تنقع الجرح في الماء حتى تختفي القشور التي تكونت وقت التئام الجرح ، عادة يحدث ذلك بعد حوالي أربعة أسابيع من الجراحة.

- قبل مغادرة الحمام أو الدش تأكد من أن تشطف الجرح الشطف النهائي بالماء الدافئ النظيف النقي.

- من المهم تجفيف الجرح بالكامل ؛ يجب أن تتربت على المنطقة بمنشفة جافة ونظيفة أو إذا أمكن السماح للمنطقة أن تجف قبل ارتداء الملابس.

-من الأفضل لطفلك أن يرتدي ملابس قطنية نظيفة بينما تلتئم الجروح.

- من الصعب أن تغسل علامات الشريط اللاصق الثابتة بحيث يكون مزيل الصمغ مفيداً ؛ يرجى السؤال عن ذلك قبل مغادرة الجناح إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى بعض من مزيل الصمغ .

- لتعزيز التئام الجروح بشكل جيد ، لا نوصي باستخدام الكريمات والمستحضرات أو الزيوت في المنطقة إلى ان يتم متابعة طفلك. وهو عادة بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الجراحة.